

宫颈癌引起的原因

赵雪妹

(泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院) 四川 泸州 646000)

【中图分类号】R711.74

【文献标识码】A

【文章编号】1674-1412(2021)14-0001-01

宫颈癌是一种常见的妇科恶性肿瘤,在女性诸多疾病中有较高发病几率。随着如今社会经济的快速发展,宫颈癌发病年龄越来越低,诸多女性朋友会选择接种疫苗对宫颈癌进行预防,但实际上,并不是接种了宫颈癌的疫苗便能有效预防宫颈癌的发生,只能使宫颈癌的发病几率有一定降低。当前对于宫颈癌的发病,人们较为确定的是与HPV有一定关联,便是与人乳头病毒感染相关,但大部分人们都觉得是诸多原因之间共同影响,最终导致了宫颈癌,包含真菌或病毒感染、宫颈糜烂样改变及不洁性行为等各种原因,甚至个人身心原因、不同生活习惯都有可能成为宫颈癌的发病原因。下面本文就引起宫颈癌的原因作出以下简要说明。

1 宫颈癌的定义

宫颈癌是妇科最常见的恶性肿瘤之一,宫颈癌在发病早期的时候无显著病症与表现,颈管型患者由于宫颈外观与正常人基本一致,所以极易漏诊或误诊^[1]。随着病情进展,会出现以下表现:(1)阴道流血。早期基本属于接触性出血,在中晚期的时候会出现不规则阴道流血,出血量会根据病灶的大小等情况而不同,若侵袭大血管会引发大出血。青年患者也会出现经期加长与经量增加;而老年患者在绝经后,阴道会出现不规则流血,通常外生型会在早期出现阴道流血情况且出血量明显增加,而内生型则较晚出现阴道流血情况。(2)阴道排液。大部分患者都有阴道排液,液体为血性或白色,呈米泔状或稀薄如水,或伴有腥臭味;晚期患者由于癌细胞出现坏死伴有不同程度的感染,会出现许多米汤样或伴有脓性且恶臭的白带。(3)晚期症状。根据病灶波及的范围会存在不同程度的症状,如尿频、下肢肿痛、尿急及便秘等,癌肿累及或压迫到输尿管时,会引发肾盂积水、尿毒症及输尿管梗阻等;晚期会出现恶病质及贫血等全身衰竭现象^[2]。

2 引起宫颈癌的原因

2.1 宫颈糜烂样改变的影响

宫颈癌的发生与宫颈糜烂样改变有十分重要的联系,本身存在宫颈糜烂样改变的患者宫颈癌的患病概率也更大,而对于未患有宫颈糜烂样改变的患者其宫颈癌的患病概率就较小。可看出,宫颈糜烂样改变对宫颈癌的发病几率。其次,当患者宫颈存在裂伤时,发生宫颈癌的几率也会随之上升,即使宫颈癌的伤口较小,也未有明显的表现,但也为细菌创造了有利的侵入条件,进而导致诸多宫颈炎。此外,女性如果性生活不洁或性卫生条件较差时,也会引起各种阴道炎,进而造成宫颈糜烂样改变,最终导致宫颈癌的发生^[3]。

2.2 性生活与婚姻的影响

女性性生活较为紊乱是引发宫颈癌的主要原因,性生活紊乱是指性生活频率过高,同时还伴有诸多性伴侣,这与宫颈癌的发病情况紧密相连。其中,在性生活的影响中,宫颈癌发生原因主要有两种类型,一种是女性既往或同时有多个性伴侣,还有一种是女性的性伴侣配偶有宫颈癌^[4]。由于当今社会的快速发展,人们的生活方式也随之出现变化,愈来愈多女性患者过早发生性行为,同时延迟了结婚的年龄,也代表着女性在婚前性行为时变换性伴侣的几率更大,这表示女性患有宫颈癌的几率便更大。其次,性生活的卫生条件过差也会加大宫颈癌的发生几率,性生活卫生条件差指的是在性生活的期间性器官不卫生,或在产褥期时过多地进行性交,性行为紊乱的女性其性伴侣可能也会性生活紊乱,甚至伴有疱疹病毒感染、

阴道滴虫感染、梅毒等诸多种类的性病史,这些均是宫颈癌最常见的发病原因。

2.3 男性包皮垢的影响

男性的包皮垢不仅会加大阴茎癌的患病几率,还与宫颈癌的发病情况紧密相连。男性包皮垢中有较大可能携带部分病菌或致病的细菌,另外,在细菌影响下,包皮垢上存在的胆固醇等物质会成为致癌物质,最终引发宫颈癌^[5]。高危男性也是引发宫颈癌的原因之一,高危男性指的是既往患有前列腺癌或阴茎癌的男性,女性与高危男性进行性行为后,其宫颈癌的患病几率也会显著增加。

2.4 真菌感染与病毒的影响

近些年,真菌感染与病毒对宫颈癌的影响引发大众的广泛关注,某些致癌病毒如单纯疱疹病毒Ⅱ型、人类乳头瘤病毒、人类巨细胞病毒及真菌感染均会加大宫颈癌患病几率。首先,女性宫颈癌组织人乳头瘤抗原检查结果显示,人乳头瘤病毒与宫颈癌的发生关系紧密相连^[6]。其次,对于人类巨细胞病毒来说,宫颈癌的发生使患者体内的人类巨细胞病毒抗体显著增加,同时人类巨细胞病毒会转变成恶性病毒。因此,病毒感染成为宫颈癌发病原因的重点关注内容,但其具体发病机制还尚未可知。

2.5 生育的影响

女性首次生产年龄越早,其发生宫颈癌的几率越高,而未婚与未生产的女性宫颈癌的几率则越低。其次,结婚次数较多的女性其宫颈癌的发病几率也较大。此外,多次分娩与分娩过程不佳,也会加大宫颈癌发病几率,但多次分娩不会加大宫颈癌发病几率^[7]。

3 小结

除了以上几种原因,经济条件与吸烟等原因也会对宫颈癌的患病几率造成影响。对于当前社会地位与经济条件较差的女性来说,其吸烟的几率也会加大;而与无吸烟习惯的女性而言,有吸烟习惯的女性宫颈癌的发病几率更大。其次,地区、生活习惯的不同、身心状态较差与免疫力较弱等多种原因也会引起宫颈癌的发生。

参考文献

- [1]李婵玉.高危型HPV在宫颈癌发生发展中的作用机制[J].实用癌症杂志,2021,36(3):519-522.
- [2]刘建华,王萍.高危型HPV感染导致宫颈癌发生的风险评估[J].医学研究生学报,2017,30(12):1233-1237.
- [3]张惠,洪璐,赵德英,等.宫颈癌根治性放疗后引起重度慢性放射性直肠炎的原因分析[J].武汉大学学报(医学版),2017,38(4):564-568.
- [4]江星元,刘应南,陶霞. HPV E6/E7在宫颈病变恶性进展或宫颈复发中的预测作用[J].中国妇产科临床杂志,2020,21(1):97-99.
- [5]金丽琴,李恩春,沈源明,等.意外发现的宫颈癌不同补救方式对预后的影响[J].现代妇产科进展,2019,28(10):769-773.
- [6]刘万清,赖曾珍,魏琴.HPV联合SCCA检测在子宫颈癌筛查和预后监测中的临床意义[J].河北医药,2018,40(14):2103-2106.
- [7]李素芳,徐宏仙,莫政,等.早期反应基因在宫颈癌中表达及其与人乳头瘤病毒感染的关系[J].中国老年学杂志,2020,40(1):149-153.